



โครงการ “CK & BEM ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19” (มอบวัคซีน “โมเดอร์นา” ให้แก่ประชาชน ฟรี)

Q & A ถามตอบ

การลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19

วัคซีน : โมเดอร์นา

กำหนดการ : **ครั้งที่ 1** วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น.

ณ อาคารวิริยะถาวร ชั้น 4 หอสมุดพระวชิรญาณ บมจ.ช.การช่าง (สำนักงานใหญ่)

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2565 เวลา 08.00 - 15.00 น.

ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักร บริเวณชั้นร้านค้า Metro Mall ใกล้ทางออกที่ 2 และ 3

วัน-เวลา ลงทะเบียน : วันนี้ถึงวันที่ 23 มิ.ย 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

ให้บริการโดย : โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

Q: ใครลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 ผ่านช่องทางนี้ได้บ้าง?

A: สำหรับคนไทย คนต่างด้าว และคนต่างชาติ และไม่เคยรับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน

อายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (กรณีอายุ 12 -17 ปีบริบูรณ์ จะต้องมียกสหายินยอมจากผู้ปกครอง)

Q: อายุ 12 ปี นับอย่างไร?

A: นับจากวันเดือนปีเกิดแบบบริบูรณ์ โดยในวันลงทะเบียน ผู้รับวัคซีนต้องมีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

Q: ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม หรือผู้ให้บริการฉีดวัคซีนที่อื่นไปแล้ว ลงทะเบียน ได้อีกหรือไม่

A: สามารถลงทะเบียนได้ ทั้งนี้เมื่อได้รับการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลของคุณ

จะบันทึกลงในหมอพร้อม และไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้อีก

Q: มีเปิดให้ walk in หรือไม่

A: มี Walk in ณ จุดฉีดวัคซีน

Q: มีผู้ลงทะเบียนรับวัคซีนเต็มแล้ว จะเปิดรับอีกหรือไม่ เมื่อใด?

A: ตามแผนปัจจุบันเปิดรับถึงวันที่ 23 มิ.ย. 65 หรือจนกว่าจะครบจำนวน หากมีการขยายเวลาจะประชาสัมพันธ์ต่อไป

Q: อยู่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนรับวัคซีนฯ ได้หรือไม่?

A: สามารถลงได้ ไม่จำกัดภูมิลาเนา แต่ต้องเดินทางมารับวัคซีน ในวัน – เวลา สถานที่ ที่กำหนดเท่านั้น

Q: จำนวนปริมาณวัคซีนโมเดอร์นาที่นำมาฉีด

A: ฉีดเต็มโดส = 100 ไมโครกรัม

Q: การลงทะเบียน แบ่งเป็นกี่ช่วงเวลา

A: แบ่งเป็น 7 ช่วงเวลา เพื่อป้องกันการแออัดของผู้ฉีดวัคซีน โดยแบ่งเป็น 8.00-9.00 น. 9.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น., 12.00-13.00 น., 13.00 -14.00 น., 14.00-15.00 น.

2. หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

Q: หลังลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ต้องทำอะไรบ้าง

A: เตรียมตัวเข้ารับการจัดวัคซีนในวันที่ 25 มิ.ย. และ 2 ก.ค. 2565

Q: ต้องการยกเลิก ต้องทำอะไร

A: สามารถแจ้งได้ที่ Email: bemfightscovid@gmail.com

Q: หากลงทะเบียนแล้ว สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้หรือไม่

A: ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ เนื่องจากต้องการมียืนยันตัวตนบุคคลผู้รับบริการอย่างถูกต้องตามบัตรประชาชน ทั้งนี้ข้อมูลการลงทะเบียน การรับวัคซีน จะถูกบันทึกตามชื่อบนบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เท่านั้น

3. วันนัดหมายรับวัคซีน

Q: ควรเตรียมตัวก่อนออกจากบ้านอย่างไรบ้าง

A: แนะนำตรวจเช็กलिष्ठก่อนออกเดินทาง ดังนี้

1. เตรียม บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
2. หลักฐานบันทึกภาพหน้าจอ(โทรศัพท์)เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
3. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่อดนอน
4. ดื่มน้ำ อย่างน้อย 500 - 1,000 มล.
5. งด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ น้ำอัดลม
6. รับประทานอาหารให้เรียบร้อย เนื่องจาก งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปภายใน (ยกเว้น น้ำเปล่านำเข้าได้)
7. งดออกกำลังกายหนัก ก่อน และหลัง ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 วัน
8. สวมใส่เสื้อผ้าที่เปิดแขนได้ง่ายถึงบริเวณต้นแขน
9. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และพกเจลแอลกอฮอล์
10. เพื่อสุขอนามัยส่วนตัว กรุณานำปากกาไปเอง เพื่อใช้กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

ข้อแนะนำด้านสุขภาพ:

หากมีไข้ หรือไม่สบาย ขอให้เลื่อนฉีดวัคซีนออกไปก่อน งดทานยาลดไข้ หรือยาแก้ปวดก่อนฉีดวัคซีน หากมีโรคประจำตัว มีประวัติแพ้ยา หรือแพ้วัคซีนกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนฉีด

4. อื่นๆ

Q: ต้องไปที่ไหน / เดินทางอย่างไร

A: **ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิ.ย. 65**

อาคารวิริยะถาวร(ห้องสุพรรณนิการ์ ชั้น 4) ซ.อินทามระ 37 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย เขตดินแดง กทม.

1.1 เดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีสุทธิสาร ทางออกที่ 4 และต่อรถตู้ของ BEM หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง

1.2 เดินทางด้วยรถประจำทางสาธารณะ (สาย 54, 74, 117, 204) ลงป้ายรถเมย์ ซ.อินทามระ 39

1.3 เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถจอดรถได้ที่ อาคารจอดรถของอาคารวิริยะถาวร

ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ก.ค. 65

รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักร บริเวณชั้นร้านค้า Metro Mall ใกล้ทางออกที่ 2 และ 3

Q: มีจุดให้บริการแยกเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้นั่งรถเข็น (Wheel Chair) ผู้พิการ ผู้ตั้งครรภ์หรือไม่

A: มี สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการฉีดวัคซีน

Q: การเข้ารับวัคซีนฯ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

A: รายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิ.ย. 65 ณ อาคารวิริยะถาวร

การรับวัคซีน มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

จุดที่ 1 : **ลงทะเบียน** โดยแสดง หลักฐานบันทึกภาพหน้าจอ(โทรศัพท์)เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย พร้อมบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเพื่อยืนยันตัวตน ลงนามยินยอมรับวัคซีน และคัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ณ บริเวณจุดคัดกรองชั้น 2 ของอาคารวิริยะถาวร

จุดที่ 2 : **ฉีดวัคซีน** รับบริการฉีดวัคซีน ณ ห้องสุพรรณนิการ์ ชั้น 4

จุดที่ 3 : **พักรอสั่งเกตอาการ** พักสังเกตอาการ 30 นาที (มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมดูแล) และจุดตรวจสุขภาพก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ Walk In สามารถแสดงหลักฐานเพื่อเข้ารับการจัด ณ จุดบริการฉีดวัคซีน

ครั้งที่ 2 วันที่ 2 ก.ค. 65 ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักร

จุดที่ 1 : **ลงทะเบียน** โดยแสดง หลักฐานบันทึกภาพหน้าจอ(โทรศัพท์)เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย พร้อมบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเพื่อยืนยันตัวตน ลงนามยินยอมรับวัคซีน และคัดกรอง/ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ณ บริเวณจุดคัดกรอง บริเวณชั้นร้านค้า Metro Mall รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักร

จุดที่ 2 : **ฉีดวัคซีน** รับบริการฉีดวัคซีน ณ ชั้นออกบัตรโดยสาร รถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักร

จุดที่ 3 : **พักรอสั่งเกตอาการ** พักสังเกตอาการ 30 นาที (มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมดูแล) และจุดตรวจสุขภาพก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ Walk In สามารถแสดงหลักฐานเพื่อเข้ารับการจัด ณ จุดบริการฉีดวัคซีน

Q: มีเจ้าหน้าที่จาก รพ.คอยดูแลที่จุดฉีดหรือไม่ กังวลใจหากเกิดการข้างเคียง หรือแพ้ยาหลังรับวัคซีน

A: หลังรับการฉีดวัคซีนแล้ว จะมีจุดให้พักรอสั่งเกตอาการ 30 นาที โดยจะมีเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และรถพยาบาล พร้อมคอยดูแล เพื่อรอสังเกตการณ์ ให้คำแนะนำ และปฐมพยาบาล

Q: มีข้อห้ามและข้อควรระวังอะไรบ้างในการฉีดวัคซีนโควิด-19

A: วัคซีนทุกชนิดมีข้อห้ามคือ แพ้สารที่เป็นส่วนประกอบของวัคซีนและเนื่องจากวัคซีนเหล่านี้เป็นวัคซีนใหม่จึงอาจไม่มีความรู้ในเรื่องปฏิกิริยาการแพ้ที่พบไม่บ่อยในช่วงแรก จึงควรฉีดวัคซีนเหล่านี้ในสถานพยาบาลหรือสถานที่ ที่ให้การช่วยเหลือกรณีมีปฏิกิริยารุนแรง และควรเฝ้าระวังอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 นาที ควรใช้วัคซีนแก่กลุ่มประชากรตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำเท่านั้น

นอกจากนี้ ไม่ควรฉีดวัคซีนในกรณีดังนี้

- ขณะที่กำลังป่วย หรือร่างกายอ่อนเพลียจากสาเหตุต่างๆ ควรเลื่อนการฉีดไปก่อนจนกว่าจะเป็นปกติ
- ในกลุ่มอายุที่ไม่ได้รับการรับรอง
- ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสแรก (แต่ฉีดในหญิงหลังคลอดหรือให้นมบุตรได้)
- ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่รุนแรงที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตที่อาการยังไม่คงที่มีโรคกำเริบ นอกจากแพทย์ประจำ ประเมินว่าฉีดได้

Q: สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคโควิด-19 มาก่อน ยังจำเป็นต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือไม่

A : สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคโควิด-19 มาก่อน แม้จะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในร่างกายแต่ในปัจจุบันยังไม่ มีข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่จะป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งต่อไปและยังมีโอกาส ติดเชื้อซ้ำได้ ดังนั้นจึงควรได้รับวัคซีนโควิด-19 เสมอแม้ว่าจะเคยเป็นโรคโควิด-19 มาก่อนก็ตาม โดยเว้นระยะห่างจากการ ติดเชื้อไปอย่างน้อย 3-6 เดือน ไม่จำเป็นต้องตรวจการติดเชื้อก่อนฉีดวัคซีน เพราะแม้จะเคยเป็นมาก่อนก็ไม่ทำให้ มีอันตรายจากการฉีดวัคซีน โดยอาจพิจารณาให้ฉีดเพียง 1 เข็ม

5. ข้อควรรู้ทางการแพทย์ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน

ก.) กลุ่มบุคคลทั่วไป

ต้องเตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนอย่างไรบ้าง กระทรวงสาธารณสุขมี 7 ข้อแนะนำ ดังนี้

- 1.) วันก่อนฉีดวัคซีน และวันหลังการฉีดวัคซีน ให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนหลับพักผ่อน ให้เพียงพอ
- 2.) วันที่ฉีด ควรกินน้ำอย่างน้อย 500 - 1,000 ซีซี งดชา กาแฟ หรือของที่มีคาเฟอีน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- 3.) ให้ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวัน อย่าใช้แขนข้างนั้น อย่าเกร็งยกของหนัก
- 4.) หลังฉีดแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที
- 5.) ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมาก ทนไม่ไหว สามารถกินยาพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัม ครั้งละ 1 เม็ด ซ้ำได้ ถ้าจำเป็น แต่ให้ห่าง 6 ชั่วโมง ห้ามกินยาพวก Brufen , Arcoxia , Celebrex เด็ดขาด
- 6.) การฉีดวัคซีนโควิด ควรห่างกับวัคซีน ป้องกันโรคไขหวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน
- 7.) หากกินยาลดลิ่มเลือดอยู่ ก็ให้กินยาตามปกติ แต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที

ข.) กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม มีแนวทางการรับวัคซีนโควิด-19 ดังนี้

1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง (โรคปอดอุดกั้น โรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี)
ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังสามารถรับวัคซีนได้ ฉีดหลังอาการกำเริบ 2 - 4 สัปดาห์
2. โรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถรับวัคซีนได้ **กรณีมีอาการหัวใจกำเริบ**
ฉับพลันที่อาการยังไม่คงที่และอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ให้รอจนกว่าอาการดีขึ้นและคงที่
กรณีมีความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรง SBP>160 mmHg ควบคุมความดันโลหิตให้ดีขึ้นก่อนรับวัคซีน
หากรับประทานยาลดไขมันเลือด ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาเพิ่มความระมัดระวัง
3. โรคไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง รวมทั้งผู้ได้รับการฟอกเลือด ล้างไตทางช่องท้องหรือปลูกถ่ายไต
สามารถรับวัคซีนได้ ในกรณีกินยากดภูมิคุ้มกันขนาดสูง ให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลก่อน
4. โรคหลอดเลือดสมอง (โรคหลอดเลือดแดง โรคลมชัก โรคภูมิคุ้มกันระบบประสาท) ผู้ป่วยโรคระบบประสาท
สามารถรับวัคซีนได้ ต้องมีอาการทางระบบประสาทคงที่ หรือไม่อยู่ในภาวะอันตรายต่อชีวิตอย่างน้อย 4 สัปดาห์
ในกรณีที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือยากดภูมิคุ้มกัน ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการรับวัคซีน
5. โรคอ้วน ผู้ป่วยโรคอ้วนสามารถรับวัคซีนได้
6. โรคมะเร็ง ผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิด สามารถรับวัคซีนได้ ผู้ป่วยรักษาโดยการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือด ให้เว้นระยะ
การให้วัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 3 เดือน / ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดให้วัคซีนห่างจากวันผ่าตัดอย่างน้อย 3 วัน
7. โรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ และโรคอ้วนสามารถรับวัคซีนได้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ขาดยา
หรือควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี และผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ต้องฉีดอินซูลินให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีน

ค.) กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ถ้าไม่มีข้อห้ามและข้อพึงระวัง สามารถรับวัคซีนได้

ง.) หญิงตั้งครรภ์

1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้ทุกชนิดที่มีในขณะนี้ เมื่อมีอายุครรภ์ มากกว่า 12 สัปดาห์
เป็นต้นไป
2. หญิงให้นมบุตร สามารถรับวัคซีนโควิด-19 ได้ทุกชนิดที่มีในขณะนี้ ไม่จำเป็นต้องงดนมแม่หลังฉีดวัคซีน
3. ถ้าฉีดวัคซีนแล้วพบว่าตั้งครรภ์จะอย่างไร: ไม่ต้องยุติการตั้งครรภ์ เมื่อพบว่าตั้งครรภ์ภายหลังฉีดวัคซีน
เพราะการศึกษาที่บ่งชี้ว่า วัคซีนไม่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ หรือการตั้งครรภ์ ควรฉีดวัคซีนโควิด-19
ครั้งที่ 2 ได้ หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ข้อมูลจาก: กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

1. แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
2. แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 4 โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 3 ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

กรณีกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer สามารถฉีดขนาดครึ่งโดสได้ ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน (ทั้งนี้ มีข้อมูลการศึกษาในผู้ใหญ่ที่แข็งแรงที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ไม่มีการศึกษาในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเด็ก)

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในเด็กอายุ 12-17 ปี

แนะนำให้เด็กอายุ 12-17 ปี ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม เข้ารับวัคซีนชนิด mRNA เป็นเข็มที่ 3 ขนาดโดสมาตรฐาน โดยมีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลาดังแต่ 4-6 เดือน ขึ้นไป

การให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19

แนะนำให้วัคซีนโควิด 19 ในผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 ได้ตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน โดยให้วัคซีนหลังจากการติดเชื้อ เป็นเวลา 3 เดือน

แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข
สำหรับการฉีดเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster dose)

	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 3	หมายเหตุ	
วัคซีน กระตุ้น เข็มที่ 3	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์	AstraZeneca	หมายเหตุ 1. เหนียงเลือกให้ ผู้รับวัคซีนสามารถรับการฉีด วัคซีน AZ เป็นเข็มกระตุ้นได้ ในผู้ที่รับการฉีด AZ ครบ 2 เข็ม โดยหากเว้นระยะห่างจาก เข็มที่ 2 เป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนสูตร AZ-AZ-AZ ภูมิอาจไม่สูงเท่า การฉีดวัคซีน AZ-AZ-PF ให้ พิจารณาฉีดผู้ที่ต้องการฉีด mRNA 2. วัคซีน Moderna สามารถ เป็นเข็มกระตุ้นได้ในทุกสูตร วัคซีนข้างต้น	
	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	3 เดือน ขึ้นไป	AstraZeneca		
	Sinovac/Sinopharm	Pfizer	3 เดือน ขึ้นไป	Pfizer		
	AstraZeneca	AstraZeneca	3 เดือน ขึ้นไป	Pfizer		
	Pfizer	Pfizer	3 เดือน ขึ้นไป	Pfizer		
	AstraZeneca	Pfizer	3 เดือน ขึ้นไป	Pfizer		
	AstraZeneca	AstraZeneca	3 เดือน ขึ้นไป	AstraZeneca		
วัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 4	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	เข็มที่ 3	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 4	
	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	4 เดือน ขึ้นไป	AstraZeneca	
	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	Pfizer	4 เดือน ขึ้นไป	Pfizer	
	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	AstraZeneca	4 เดือน ขึ้นไป	Pfizer	
	AstraZeneca	AstraZeneca	Pfizer	4 เดือน ขึ้นไป	Pfizer	

กรณีกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer สามารถฉีดขนาดครึ่งโดสได้ ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน (ทั้งนี้ มีข้อมูลการศึกษาในผู้ใหญ่ที่แข็งแรงที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี แต่ไม่มีการศึกษาในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือเด็ก)



สูตรวัคซีน

เข็ม 1 และ เข็ม 2

กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

อายุ 18 ปีขึ้นไป

- ☐ AstraZeneca + AstraZeneca .. ห่างกัน 8-12 สัปดาห์
- ☐ AstraZeneca + Pfizer (ฝาม่วง) .. ห่างกัน 4-12 สัปดาห์
- ☐ Pfizer (ฝาม่วง) + AstraZeneca .. ห่างกัน 4 สัปดาห์
- ☐ Moderna + Moderna .. ห่างกัน 4 สัปดาห์



กลุ่มอายุ 5 - 17 ปี

อายุ 5 - 6 ปี

- ☐ Pfizer (ฝาส้ม) + Pfizer (ฝาส้ม) .. ห่างกัน 8 สัปดาห์

อายุ 6 - 11 ปี

- ☐ Pfizer (ฝาส้ม) + Pfizer (ฝาส้ม) .. ห่างกัน 8 สัปดาห์
- ☐ Sinovac + Pfizer (ฝาส้ม) .. ห่างกัน 4 สัปดาห์

อายุ 12 - 17 ปี

- ☐ Pfizer (ฝาม่วง) + Pfizer (ฝาม่วง) .. ห่างกัน 3-4 สัปดาห์
- ☐ Sinovac + Pfizer (ฝาม่วง) .. ห่างกัน 4 สัปดาห์

* หลังฉีดครบ 2 เข็ม 4 - 6 เดือนขึ้นไป ควรฉีดเข็มกระตุ้นด้วย Pfizer/ Moderna

อายุ 6 - 17 ปี

- ☐ Sinovac + Sinovac .. ห่างกัน 4 สัปดาห์

* ควรกระตุ้นด้วย Pfizer 1 เข็ม หลังเข็ม 2 นาน 4 สัปดาห์



ผู้เคยติดเชื้อ ใช้สูตรเดียวกัน ฉีดหลังติดเชื้อ 3 เดือน



สูตรวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็ม 3

(Booster dose) กระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป

- Sinovac/Sinopharm + Sinovac/Sinopharm — 4 สัปดาห์ขึ้นไป —> ฉีด AstraZeneca
- Sinovac/Sinopharm + AstraZeneca — 3 เดือนขึ้นไป —> ฉีด AstraZeneca
- Sinovac/Sinopharm + Pfizer — 3 เดือนขึ้นไป —> ฉีด Pfizer
- AstraZeneca + AstraZeneca — 3 เดือนขึ้นไป (เว้น 6 เดือนได้ภูมิสูงขึ้น) —> ฉีด AstraZeneca (กรณีไม่ต้องการฉีด mRNA)
- Pfizer + Pfizer — 3 เดือนขึ้นไป —> ฉีด Pfizer
- AstraZeneca + Pfizer — 3 เดือนขึ้นไป —> ฉีด Pfizer



★ วัคซีน Moderna ใช้เป็นเข็มกระตุ้นได้ทุกสูตร

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565



สูตรวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เข็ม 4

(Booster dose) กระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป



Sinovac/Sinopharm + Sinovac/Sinopharm + AstraZeneca

4 เดือนขึ้นไป

→ ฉีด AstraZeneca



Sinovac/Sinopharm + Sinovac/Sinopharm + Pfizer

4 เดือนขึ้นไป

→ ฉีด Pfizer



Sinovac/Sinopharm + AstraZeneca + AstraZeneca

4 เดือนขึ้นไป

→ ฉีด Pfizer



AstraZeneca + AstraZeneca + Pfizer

4 เดือนขึ้นไป

→ ฉีด Pfizer



★ วัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น ฉีดครั้งใดก็ได้ ตามดุลพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

★ วัคซีน Moderna ใช้เป็นเข็มกระตุ้นได้ทุกสูตร

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565

